



Versatis®

lidokain

plåster

Lokalbedövningsmedel

Indikationer på smärtemottagningen

Ytliga smärtor där man kan misstänka neuropatisk komponent. T ex post-herpetisk neuralgi, perifer polyneuropati, ärrsmärta efter operation.

Kontraindikationer var god se FASS

I praktiken inga förutom känd allergi mot lokalanestetika av amidtyp.

Interaktioner var god se FASS

I praktiken inga.

Vanliga biverkningar

Hudirritation på appliceringsstället. Kan behandlas med salvor under den tid man ej har plåstret på.

Informera patienten att huden blir inte bedövad av Versatis®

Dosering

Plåster appliceras på det smärtande området 12 h per dygn. Enligt FASS max 3 st plåster på vuxen person. Det finns dock flertal studier som visar att 4 plåster går utmärkt.

OK att använda på barn. Dosera efter vikt. (Utgångspunkt vuxen på 70 kg kan ha 4 plåster, 35 kg barn kan ha 2 plåster o s v.)

Det går utmärkt att klippa till mindre bitar och spara resten tills nästa dag (håller 14 dagar).

Utvärdering av effekt



Vanligtvis ser man effekt efter några dygn, men det kan ta upp till 2-4 veckor innan man får full effekt.

Uppföljning

Pat får höra av sig vid behov, annars uppföljning efter 2, 6 och 10 veckor.

Praktiska tips

Plåstret ska appliceras på torr intakt hud. Om mycket hår klipper man bort det. Raka inte.

Bad, dusch och simning får plåstret att lossna.

Vid byte drar man långsamt bort plåstret. Vid behov kan man blöta ned det med varmt vatten.

Utsättning

Pröva sätta ut behandlingen var tredje månad och utvärdera om den fortfarande behövs. Minska först till plåster varannan dag, sedan var tredje dag. Vissa pat kan inte avsluta behandlingen men klarar sig med ett plåster var tredje dag.

Gunnar Green
Överläkare
Smärtmottagningen
Östersunds sjukhus