

Targiniq®

Är en kombination av en opiat, (morfinliknande ämne) (oxikodon (samma som finns i Oxycontin®/Oxynorm®) och ett motgift mot opiater (naloxon). När tabletterna bryts ned i tarmen tas läkemedlen upp och fraktas till levern. Eftersom naloxon bryts ned helt i levern får man endast effekt av detta medel i mag-tarmkanalen. På det sättet minskar man magbiverkningarna, men får ändå full smärtlindrande effekt

Används på Smärtmottagningen för

Opiatkänsliga smärtor där andra opiater inte kan ges på grund av uttalade mag-tarmbesvär.

Vanliga biverkningar

Yrsel.

Trötthet.

Risk för diarréer och magknip framförallt initialt när Du står på medel för hård mage. Det kan hända att Du måste sänka den dosen.

Dosering

Eftersom Du oftast redan har ätit en opiatinnehållande medicin utgår man från den dosen, räknar om och startar därefter Targiniq®.

Om Du inte tidigare ätit någon opiat är startdosen 10 mg/5 mg x 2.

Upptitrering av dosen sker var 3:e till var 7:e dag med tabletten 5 mg /2,5 mg x 2.



OBSERVERA ATT DETTA ÄR MAX-FART! Om Du av någon anledning inte mår riktigt bra, stanna kvar på dosen ytterligare några dagar.

Vanligtvis räcker 20 mg/10 mg x 2 Men högre doser kan behövas. Max-dos är 40 mg/20 mg x 2.

Observera att det är ett långtidsverkande preparat och skall tas regelbundet. Man kan inte använda det som akutmedicinering vid smärtgenombrott.

Avslutande av Targiniq® (så kallad utsättning)

Dosen sänks med 5 mg/2,5 mg x 2 var tredje dag. OBSERVERA ATT DETTA ÄR MAX-FART! Om Du går långsammare fram gör det ingenting.

Har man för bråttom riskerar man att må dåligt, man får så kallade utsättningssymptom.

Behandlingstid

Efter 6 - 12 månaders behandling rekommenderar vi att man gör ett utsättningsförsök. Sänk då dosen på samma sätt. Om Du då upplever att smärtan förvärras kan Du återinsätta behandlingen. Gör därefter utsättningsförsök var 6:e-12:e månad.

Gunnar Green
Överläkare
Smärtemottagningen
Östersunds sjukhus