



Versatis®

lidokain (lokalbedövningsmedel)
plåster

Används på smärtmottagningen för:

Hudsmärtor där man kan misstänka neuropatiska (nervrelaterade) smärtor - t ex smärta efter bältros, nervskada orsakad av sjukdom, ärrsmärta efter operation.

Dosering

Plåster appliceras på det smärtande området under 12 timmar per dygn. Upp till 4 plåster går utmärkt att använda vid ett och samma behandlingstillfälle.

Det går att klippa till mindre bitar och spara resten tills nästa dag (håller 14 dagar).

Utvärdering av effekt

Vanligtvis märker Du effekt efter några dygn, men det kan ta upp till 2-4 veckor innan Du får full effekt.

Vanliga biverkningar

Hudirritation på appliceringsstället. Kan behandlas med salvor under den tid man ej har plåstret på. Observera att huden inte blir bedövad av Versatis®

Praktiska tips

Plåstret ska appliceras på torr intakt hud. Om mycket hår klipper Du bort det. Raka inte.

Bad, dusch och simning får plåstret att lossna.



Vid byte drar Du långsamt bort plåstret. Vid behov kan Du blöta plåstret med varmt vatten så lossnar det lättare.

Avslutande av Versatis (så kallad utsättning)

Behandlingen kan avslutas direkt.

Behandlingstid

Pröva sätta ut behandlingen var tredje månad och utvärdera om den fortfarande behövs. Minska först till plåster varannan dag, sen var tredje dag. Vissa kan inte avsluta behandlingen men klarar sig med ett plåster var tredje dag. Får man mer ont går man upp till tidigare dos.

Gunnar Green
Överläkare
Smärtmottagningen
Östersunds sjukhus