



Tapentadol patientinformation

Palexia Depot®

Ett läkemedel som har en dubbel verkningsmekanism. Dels är preparatet morfinliknande men det ger också en förstärkning av kroppens egna smärthämmande system.

Används på smärtmottagningen för smärttillstånd som är känsliga för morfin och morfinliknande (ex. buprenorfinplåster som Norspan®) preparat men där effekten är otillräcklig.

Dosering

Palexia Depot® ska tas 2 gånger per dag med 12 timmars mellanrum (= 1x2). Får ej delas. Den ska tas regelbundet och INTE användas som ”vid behovs” medicinering vid smärtgenombrott.

Startdos är 50mg 1 x 2 där första dosen med fördel tas till natten.

Dosökning med en tablett på 50 mg morgon och kväll var tredje till var sjunde dag.

Max dos är 250 mg 1 x 2. En vanlig dos är 100 mg 1 x 2.

När du redan står på Morfin eller Morfinliknande preparat räknar den som sätter in preparatet ut vilken startdos du ska starta med.

Vanliga biverkningar

Illamående

Förstoppning

Yrsel

Huvudvärk

Trötthet

Uttrappning av medicinen så kallad utsättning

Dygnsdosen trappas ned med 50 - 100 mg var tredje till sjunde dag.

Behandlingstid

Efter 6 - 12 månaders behandling rekommenderas att man gör ett utsättningsförsök. Ta kontakt med din läkare och diskutera detta.

Gunnar Green
Överläkare
Smärtmottagningen
Östersunds sjukhus.