

Moventig Patentinformation

Moventig® (naloxegol)

Används på Smärtmottagningen

till vuxna för att behandla förstoppning orsakad av smärtlindrande läkemedel, så kallade opioider (t.ex. morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol och kodein), som tas regelbundet. Det används när andra laxermedel inte har hjälpt mot förstoppning.

Dosering

Rekommenderad dos är en 25 mg-tablett dagligen.

Ta Moventig på morgonen, så att du slipper gå på toaletten mitt i natten. Moventig ska tas på tom mage, minst 30 minuter före dagens första måltid eller 2 timmar efter dagens första måltid.

Om du glömmer att ta en dos Moventig och det är mindre än 12 timmar kvar till nästa dos ska du hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera missad dos.

När du börjar med Moventig rekommenderas du sluta med alla andra laxermedel. Läkare bedömer om / när du kan börja med dem igen.

Du kan behöva ta en lägre dos på 12,5 mg om du har njurproblem eller tar diltiazem (Cardizem®) eller verapamil (Verapamil®, Isoptin®) mot högt blodtryck eller kärlkramp. Läkare bedömer i så fall detta och kan eventuellt höja din dos till 25 mg, beroende på hur du reagerar på behandlingen.

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, med det är inte alla som får dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) är magsmärtor, diarré (frekvent och vattning avföring).

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är tarmgaser, illamående, kräkningar, nasofaryngit (rinnande eller täppt näsa), huvudvärk, kraftig svettning.

Gunnar Green

Överläkare smärtmottagningen

Östersunds Sjukhus