



Lamotrigin

Lamictal®
tablett 25, 50, 100 och 200 mg
Antiepileptikum

Indikationer på smärtenheten

Centrala neuropatiska smärtor, framförallt post-stroke, där andra läkemedel mot neuropatisk smärta ej givit effekt. Kan även provas som andrahandsmedel vid post-commotionell huvudvärk. Kan även provas vid andra långvariga smärtor där andra smärtläkemedel ej givit effekt.

Kontraindikationer var god se FASS

Interaktioner var god se FASS

Vissa läkemedel påverkar metabolismen av lamotrigin och därmed behövs annan dosering.

Vanliga biverkningar

Buksmärta, diarré, huvudvärk, yrsel.

Hudutslag i sällsynta fall Steven Johnson syndrom. Instruera pat att genast höra av sig om den fått hudutslag.

Långsam upptitrering minskar risken för biverkningar.

Dosering (Om pat ej står på läkemedel som påverkar metabolismen)

25 mg x 1 i två veckor.

Därefter 50 mg x 1 eller 25 mg x 2 i två veckor.

Förklara att man knappast kan räkna med effekt på denna dos

Därefter höjs dosen med 50 mg x1 eller 25 mg x 2 en gång i veckan.

En del pat har mindre biverkningar vid tvådosförfarande.

Måldos 200mg x 1 eller 100 mg x2

Maxdos 400 gm x 1 eller 200 mg x 2

Uppföljning

Pat får höra av sig vid behov, annars uppföljning efter 1 och 2 månader

Utsättning

Sänk dygnsdos med 50 mg per vecka.

Behandlingstid

Efter 6 - 12 månaders behandling rekommenderas att man gör ett utsättningsförsök. Om pat då upplever att smärtan förvärras kan han/hon återinsätta behandlingen. Instruera att man därefter gör utsättningsförsök var 6e-12e månad.

Gunnar Green
Överläkare
Smärtmottagningen
Östersund Sjukhus