

Barn Handlingsplan vid risk för anafylaktisk reaktion (för vårdpersonal)

Personnummer:

Namn:

Namn/Telefon föräldrar/anhöriga
.....

Vid intag av eller behandling med det allergiframkallande ämnet:
.....

OCH

Lindrig reaktion

Symtom:

- Hudutslag med klåda (nässelutslag)
- Klåda/rinnande ögon/näsa
- Svullnad klåda mun och svalg
- Svullna läppar/ögonlock

Åtgärd:

1. Ge antihistamin:.....
mängd:.....

Kontakta föräldrar/anhörig.

Om symtomen ökar, gå vidare med åtgärd enligt nedan.

Kraftig reaktion

- Är oftast en reaktion från flera organ samtidigt som kan var lindriga från början men snabbt kan förvärras.

Symtom:

- Utbrett nässelutslag, kraftig rodnad och/eller svår klåda över stora delar av kroppen
- Ökande svullnad i mun och svalg med heshet eller svårt att tala
- Tydliga andningsbesvär: hosta, astma, eller andra andningssvårigheter
- Tilltagande magsmärter och/eller kräkningar
- Kallsvett, blekhet
- Oro, ångest, tilltagande trötthet, medvetnslöshet

Åtgärd:

1. Ge adrenalinpenna :.....
Skall ges i lårets övre yttre muskel. Om dålig effekt kan denna dos upprepas efter 5-10 minuter
2. BT, puls, saturation
3. Sätt i.v infart.
Koppla Ringer-Acetat 20 ml/kg:
.....
4. Om astmasymtom (hosta, svårt andas) ge astmamedicin
Om dålig effekt kan denna dos upprepas inom 5-10 minuter
5. Kontakta föräldrar/anhörig
6. Om ej redan tidigare gjort ge antihistamin:
mängd:.....
7. Kortison (t.ex. Betapred) verkar ej akut och är därför ej viktigt initialt men kan nu ges i form av mängd: kan lösas i vatten

Datum.....

Behandlande läkare.....

Sökare/tel.nr.....